CICATUL®n.f.

EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE

Óvulos

Venta bajo receta

Industria Argentina

COMPOSICIÓN:
Cada óvulo contiene:
Extracto acuoso de Triticum Vulgare 0,6 g. Excipientes: 2- Fenoxietanol,Polietilenglicol 400, Polietilenglicol 1500, Polietilenglicol 12000.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Cicatrizante, antiséptico, reepitelizante, regenerador tisular.

INDICACIONES:
Indicado para activar procesos de cicatrización y reepitelización de lesiones cervicovaginales. Trastornos inflamatorios y distróficos de la mucosa vaginal. Erosiones cervicales y cervicitis. Vulvitis y vulvovaginitis crónicas. Tratamiento regenerativo cérvico-vaginal.
Lesiones consecutivas de radioterapia y toda afección del aparato gentinal femenino, que requiera una acción cicatrizante, antiséptica y/o antiinflamatoria.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS
El extracto acuoso de Triticum Vulgare ejerce una intensa aceleración de los procesos reparatorios tisulares, estimula la quimiostasis y la maduración fibroblástica y aumenta significativamente el indice fibroblástico, punto crucial del proceso reparativo. Tal actividad se encuentra confirmada tanto por el aumento de la síntesis proteica como el aumento de la capacidad de captación e incorporación de la prolina marcada, por parte de los tejidos.
El 2-Fenoxietanol ejerce acción bacteriostática sobre microorganismos grampositivos y gramnegativos incluyendo a Pseudomonas aeruginosa, por lo cual reduce la aparición de infecciones y actúa como coadyuvante de la terapéutica antimicrobiana.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar un óvulo al día, preferentemente por la noche antes de acostarse o según prescripción médica, introduciéndolo en el fondo de la vagina.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Como todos los productos de uso tópico, el uso prolongado, puede ocasionar la aparición de sensibilización. En este caso, se debe suspender el tratamiento.

EFECTOS ADVERSOS:
No se han reportado efectos adversos.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Cicatul® n.f. puede ser administrado durante el embarazo y la lactancia ya que no tiene ninguna influencia sobre el proceso de gestación y el desarrollo embriofetal y neonatal.

INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS:
No se conocen interacciones o incompatibilidades a la fecha.

SOBREDOSIFICACIÓN:
No se han reportado casos de sobredosis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:
HOSPITAL DE PEDIATRÍA DR. RICARDO GUTIERREZ: TE. (011) 4962-6666/2247
HOSPITAL DE AGUDOS DR. ALEJANDRO POSADAS: TE. (011) 4654-6648/4658-7777.
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO ELIZALDE (011) 4300-2115/4362-6063
HOSPITAL DE PEDIATRÍA SOR MARIA LUDOVICO (0221) 451-5555

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

PRESENTACIÓN:
Envase por 6 óvulos.

MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR A 25°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.Certificado Nº 40.986.

Última revisión: Diciembre 2021.

Megalabs

Megalabs Argentina S.A.U.
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico

2005120164 C