Megalabs Argentina S.A.U.
Oficina: Vuelta de Obligado 2775 - C1428ADS
Planta: Cuba 2760 - C1428AET
Buenos Aires - Argentina
www.megalabs.com.ar
info@megalabs.com.ar

t: (+5411) 2150 2220

Megalabs

Ciruelax FORTE®

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

EXTRACTO SECO DE HOJAS DE CASSIA ANGUSTIFOLIA V.

LEA CON CUIDADO ESTE PROSPECTO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA USTED.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. Sin embargo, debe ser utilizado adecuadamente. Guarde este prospecto, puede necesitar leerlo nuevamente.

-Si usted está tomando algún medicamento consulte a su médico o farmacéutico.

-Si los síntomas empeoran o persisten por más de 4 días consulte a su médico o farmacéutico.

-Si algún efecto no deseado usted lo considera grave o no está descripto en este prospecto consulte a su médico o farmacéutico.

VENTA LIBRE

¿QUÉ CONTIENE CIRUELAX FORTE?

Ingrediente activo: Cada comprimido contiene 125 miligramos de Extracto Seco de hojas de Cassia Angustifolia V 20 % p/p (Senna alexandrina Mill) (equivalente a 25 miligramos de derivados hidroxiantracénicos, expresados como senósido B)

Excipientes: Maltodextrina, Croscarmelosa Sódica, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de Silicio, Almidón Pregelatinizado, Almidón Glicolato de Sodio, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Dextrina, Dextrosa Monohidrato, Carboximetilcelulosa Sódica, Lecitina de Soya, Citrato de Sodio Dihidrato

ACCIÓN. CÓMO FUNCIONA CIRUELAX FORTE

Laxante.

¿PARA QUÉ SE USA CIRUELAX FORTE?

Medicamento herbario utilizado para el tratamiento de la constipación ocasional por breves periodos de tiempo.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CIRUELAX FORTE?

Megalabs Argentina S.A.U.
Oficina: Vuelta de Obligado 2775 - C1428ADS
Planta: Cuba 2760 - C1428AET
Buenos Aires - Argentina
www.megalabs.com.ar
info@megalabs.com.ar

t: (+5411) 2150 2220

NO USE este medicamento:

-Si Ud. sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.

-En niños menores de 12 años.

-Si Ud. está dando pecho a su bebé.

-Si Ud. tiene constipación crónica.

-Si Ud. tiene obstrucción intestinal confirmada o sospechada

-En caso de dolores abdominales no diagnosticados, náuseas, vómitos o fiebre

- Si ud. Tiene apendicitis confirmada o sospechada.

-Si Ud. padece alguna enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de colon irritable o diverticulitis.

-Si se encuentra con desequilibrio hidroelectrolítico.

- En la obstrucción o perforación intestinal ya que puede empeorar los síntomas.

- En caso de pacientes con colonopatías, íleo, estenosis o atonía.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR CIRUELAX FORTE?

Si está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de

tomar este medicamento. La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente evaluada por su médico o farmacéutico en embarazo y lactancia.

Este medicamento no interfiere con la capacidad de conducir o uso de

máquinas.

Uso de otros medicamentos

Si Ud. toma al mismo tiempo antiinflamatorios puede suceder que aumenten los efectos de irritación gástrica.

Si Ud. toma al mismo tiempo drogas que producen hipocalemia como por ejemplo

diuréticos tiazídicos, adenocorticoides y raíz de regalíz, puede suceder que aumente el desbalance electrolítico.

Si Ud. toma al mismo tiempo indometacina puede suceder que disminuya parcialmente el efecto de este producto.

Si Ud. toma al mismo tiempo antiarrítmicos tipo quinidina puede suceder que se potencie la aparición de arritmias debido a la hipopotasemia que produce.

Megalabs Argentina S.A.U.
Oficina: Vuelta de Obligado 2775 - C1428ADS
Planta: Cuba 2760 - C1428AET
Buenos Aires - Argentina
www.megalabs.com.ar
info@megalabs.com.ar

t: (+5411) 2150 2220

Si Ud. toma al mismo tiempo glicósidos cardiotónicos (digitalis) puede suceder que aumenten los efectos de los mismos por el aumento de la pérdida de potasio.

Debido a que este producto acelera el tránsito intestinal, puede haber una disminución de la absorción de otros medicamentos y algunos alimentos.

"Si Ud. recibe algún otro medicamento consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento."

POSIBLES EFECTOS NO DESEADOS

Su uso por períodos prolongados o en altas dosis puede dar lugar a la aparición de desbalances hidroelectrolíticos (más frecuentemente pérdida de potasio), albuminuria (albumina en orina), hematuria (sangre en orina), depósitos de pigmentos en la mucosa intestinal (pseudomelanosis colónica) y atonías (falta de tono) colónicas. Todas estas

alteraciones regresan usualmente a la normalidad cuando la medicación es suspendida, sin embargo la pérdida de potasio puede conducir a anormalidades cardíacas y/o musculares, especialmente en pacientes que reciben concomitantemente digitálicos, diuréticos y/o corticoesteroides.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como:

vómito, diarrea, pérdida de la función normal del intestino cuando se usa excesivamente, dolor cólico (especialmente en la constipación severa), mala absorción de nutrientes,

colon catártico con el uso crónico, constipación después de la catarsis, heces amarillas o amarillo verdosas, pigmentación oscura en la mucosa rectal cuando se usa a largo plazo, la cual es reversible en un lapso de 4 a 12 meses; debilidad e hipotensión ortostática (cambios en la presión arterial al pasar de estar acostado a estar de pie), que puede

exacerbarse en pacientes ancianos cuando los laxantes se usan en forma

repetida.

En el aparato génito-urinario, se puede encontrar una coloración rojiza en la orina

alcalina o amarillo café en la orina ácida.

En casos aislados se pueden presentar signos de hipersensibilidad,

caracterizados por: prurito, picazón, rush cutáneo, que ceden al suspender la

administración.

También se puede encontrar hipocalemia, enteropatía proteínica y desequilibrio

electrolítico en el uso exclusivo. Se ha reportado la perdida de la inervación intrínseca y atrofia de la capa muscular lisa.

Si observa éstas o cualquier otra reacción adversa no descripta en este prospecto,

Megalabs Argentina S.A.U.
Oficina: Vuelta de Obligado 2775 - C1428ADS
Planta: Cuba 2760 - C1428AET
Buenos Aires - Argentina
www.megalabs.com.ar
info@megalabs.com.ar

t: (+5411) 2150 2220

consulte con su médico o farmacéutico

Los laxantes de este tipo deben ser ingeridos durante breves períodos, usualmente no más de cuatro días. Su uso por períodos prolongados produce fenómenos de abuso o hábito con la consecuente aparición de los efectos no deseados que se mencionan en este prospecto

¿CÓMO SE USA CIRUELAX FORTE?

Vía de Administración: Oral.

Dosis: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido recubierto al día,

antes de acostarse. Si la dosis anterior es insuficiente, se puede administrar como

máximo 2 comprimidos al día antes de acostarse.

Uso en ancianos: Los pacientes ancianos deben comenzar tomando la mitad de la dosis recomendada para adultos.

En general es suficiente tomar este laxante 2 o 3 días para obtener el efecto buscado,

si los síntomas persisten o empeoran por más de cuatro días consulte a su médico

o farmacéutico.

Recomendaciones: Los laxantes son medicamentos que ayudan a

La evacuación intestinal en circunstancias especiales, por lo que es necesario que el

paciente tome en cuenta las siguientes medidas:

La alimentación debe ser rica en fibras vegetales y debe contemplar una ingesta

de agua adecuada.

Realizar una actividad física regular (caminar o practicar algún deporte de su

agrado).

Establecer un horario adecuado para facilitar la evacuación intestinal.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

En caso de sobredosis o de ingestión accidental de grandes cantidades pueden

aparecer dolores de tipo cólico y diarrea severa, de manera que será necesario

reponer los líquidos y en el caso particular de ancianos o personas que han tomado al

mismo tiempo, glucósidos cardiotónicos, diuréticos, corticoesteroides. o raíz de

regaliz, deberán acudir al médico para que se les controle los niveles de potasio.

Megalabs Argentina S.A.U.
Oficina: Vuelta de Obligado 2775 - C1428ADS
Planta: Cuba 2760 - C1428AET
Buenos Aires - Argentina
www.megalabs.com.ar
info@megalabs.com.ar

t: (+5411) 2150 2220

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Teléfonos de Centros de Intoxicación:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Si Ud. tiene alguna pregunta comuníquese con el Servicio de Atención al Consumidor:

0-800-777-427336 info@megalabs.com.ar o con ANMAT Responde: 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

FORMA DE CONSERVACIÓN: Mantener a no más de 30 ºC, en el envase original cerrado y en un ambiente sin exceso de humedad.

PRESENTACIONES: Envases de 24 comprimidos recubiertos.

Elaborado en Laboratorios

GARDEN HOUSE Farmacéutica S.A.:

Av. Pdte. J. Alessandri 12.310, San Bernardo,

Santiago de Chile, Chile

Importado por

Megalabs Argentina S.A.U.

Cuba 2760 (1428) CABA – Argentina

Director Técnico: Gustavo Aguirre – Farmacéutico

Certificado Nº 58666

Fecha de revisión del prospecto autorizado

por la ANMAT: 23/02/2018.