Honguil®
Tioconazol 300 mg
Óvulos (Cápsulas vaginales)

Venta bajo receta

COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene: Tioconazol 300,0 mg
Excipientes: Excipientes: Vaselina Liquida, Vaselina Solida, Gelatina, Glicerina Anhidra, Rojo FD&C N° 40, Amarillo FD&C N° 6, Metilparabeno, Propilparabeno, Dioxido de Titanio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Derivado imidazólico (según clasificación ATC G01A F08).

INDICACIONES:
Honguil® está indicado para el tratamiento local de pacientes con infecciones vaginales causadas especialmente por cándidas.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:
Acción farmacológica: Interfiere en el crecimiento normal del hongo, ya que inhibe la producción de ergosterol, un componente de la pared celular, e impide que el hongo se reproduzca.
Espectro antimicrobiano: De acuerdo a los ensayos clínicos, el tioconazol es eficaz para tratar las micosis vaginales debidas a Cándida albicans o a otro tipo de Cándida, a Torulopsis glabrata, y a infecciones vaginales debidas a Trichomonas vaginalis.
Para tratar de manera eficaz las infecciones causadas por Trichomonas vaginalis es conveniente prescribir adicionalmente un triconomicida oral.
Farmacocinética: Se ha demostrado que la absorción sistémica de Honguil® después de una aplicación vaginal es insignificante.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:
Un óvulo se introduce hasta el fondo de la vagina por la noche al acostarse. En la mayoría de los pacientes una sola aplicación logra curación. En las que mejoran pero no curan, podría repetirse la aplicación una semana más tarde.

CONTRAINDICACIONES:
Absolutas: Antecedentes de hipersensibilidad manifiesta a la droga, a los derivados imidazólicos, o a otro componente del óvulo. Niñas menores de 12 años de edad.

ADVERTENCIAS:
De persistir los síntomas, se deberá hacer un análisis microbiológico adecuado para clasificar al microorganismo y aplicar otra terapia.
Este medicamento no debe ser administrado por vía oral.
Los constituyentes de los óvulos pueden ser incompatibles con el caucho de los preservativos y diafragmas.
No utilizar si presenta dolor abdominal, fiebre, nauseas, vómitos, diarrea.
Si los síntomas no mejoran en 3 días o si persisten por 7 días, el médico recomendará otro tratamiento.
No utilice tampones cuando use este medicamento.
No usar en niñas menores de 12 años de edad.
No aplicar durante la menstruación.

PRECAUCIONES:
Generales: Se recomienda acompañar su uso por estrictas normas de higiene y aseo. Administrar con precaución en pacientes con antecedentes de vaginitis severa de cualquier etiología o con lesiones abiertas en la mucosa vaginal. El uso de éste producto no previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Uso en embarazo / lactancia: En el embarazo o la lactancia consultar al médico. No se ha determinado su inocuidad en el embarazo, por ello se evaluará la relación riesgo-beneficio durante el primer trimestre de la gestación. No hay estudios suficientes que aseguren un riesgo para el feto o la madre. Se comprobó que una dosis única no afecta el normal desarrollo del embarazo, y es efectivo en el tratamiento de la candidiasis vaginal asociada al mismo. Se desconoce si el Tioconazol es excretado en la leche materna; por ello se recomienda suspender la lactancia durante el tratamiento con Tioconazol.
Uso en pediatría: La seguridad y eficacia no han sido comprobadas, por lo tanto, no está indicado su uso en menores de 12 años de edad.
Uso en geriatría: No se han documentado problemas.
Interacciones: Alcohol, riesgo de reacción tipo disulfiram.

REACCIONES ADVERSAS:
Honguil® tiene buena tolerancia local y mínima absorción sistémica. No han sido observadas reacciones adversas sistémicas tras la aplicación vaginal de esta droga.
Las reacciones adversas más frecuentes son locales, generando eritema, ardor, prurito; casi siempre de carácter transitorio y al iniciar la terapia. Muy raramente se reportan casos de secreciones vaginales, edema, descamación, dolor, sequedad o irritación.

PRESENTACION:
Envase conteniendo 1 óvulo.

SOBREDOSIFICACIÓN:
Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación: Luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: Vómito provocado o Lavado gástrico, Carbón activado, Purgante salino (45 a 60 min. luego del C.A.), Hemodiálisis. Antídotos específicos, si existen.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO A TEMPERATURAS ENTRE 15°C Y 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 29657

Fecha de última revisión: 30/5/2006

Megalabs
Megalabs Argentina S.A.U.
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico

20051201 73 C