LACTIBON®
ÁCIDO LÁCTICO
Óvulos

Industria Argentina — Venta bajo receta

COMPOSICIÓN:
Cada óvulo contiene:
Ácido láctico 190 mg
(equivalente a 171 mg de Ácido láctico puro).
Excipientes: Fenoxietanol 40 mg, Glicéridos de ácidos grasos saturados c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Restitución rápida y eficiente de la acidez propia del medio vaginal. Tratamiento y profilaxis de la vaginosis bacteriana.

Código ATC: G01AD01

INDICACIONES:
Indicado en vaginosis bacteriana recidivante, previniendo las recidivas, luego de la aplicación de antibióticos locales o sistémicos. Infecciones genitourinarias recurrentes en pacientes sexualmente activas. Infecciones genitourinarias recurrentes en pacientes menopáusicas. Atrofia vaginal en pacientes postmenopaúsicas. Pacientes embarazadas con antecedentes de vaginosis bacteriana. Uso de dispositivos vaginales (diafragma, pesario), luego de metrorragias o menstruaciones abundantes). Hipotiroidismo, diabetes, anticoncepción hormonal, higiene inadecuada, actividad sexual frecuente.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:
Mecanismo de acción:
La vagina está colonizada por una gran cantidad de bacterias que constituyen la flora vaginal. Entre ellas destaca la presencia de los bacilos de Döderlein (Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus vaginales). Estos juegan un papel fundamental en la conservación del equilibrio bacteriano (predominio de Lactobacilos sobre Gardnerella vaginalis y anaerobios) cuya alteración resulta en vaginosis bacteriana. Los Lactobacilos son los responsables de producir ácido láctico por fermentación láctica del glucógeno producido por las células epiteliales de la mucosa vaginal. Esto produce la acidificación del medio, resultando en una acción bactericida, (excepto para los bacilos de Döderlein, resistentes a la acidez), impidiendo el desarrollo intravaginal de microorganismos patógenos y favoreciendo por lo tanto la normalización de la flora vaginal.
Farmacocinética:
No es absorbido por la mucosa vaginal.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Vaginosis bacteriana recidivante: 1 óvulo por noche, durante 3 días a continuación de la cesación del período, durante 4 a 6 meses, como profilaxis.
Vaginosis bacteriana: 1 óvulo por noche, durante 7 días, asociado en los 3 primeros días, a óvulos de antibióticos
Pacientes con infecciones genitourinarias recidivantes: 1 óvulo por noche durante 3 días a continuación de la cesación del período, durante 4 a 6 meses.

Administración:
Separar las aletas superiores, tirar hacia abajo, hasta que el óvulo quede libre, sacar del alvéolo e insertar profundamente en la vagina.
- No ingerir ni administrar por otras vías. No está recomendado en mujeres vírgenes.
- No emplear sin consulta previa con su médico.

CONTRAINDICACIONES:
Lesiones genitales debidas a hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Uso en pediatría: No está indicado su empleo en niñas.

EFECTOS ADVERSOS:
Raramente se produce irritación local.

SOBREDOSIFICACIÓN:
No se han reportado casos de sobredosis no tratadas.
Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez. (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas. (011) 4654-7777 / 4658-7777
Cualquier duda deberá consultar con su médico, quien dispone de información más detallada.

PRESENTACIONES:
Envases conteniendo 7 óvulos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, A TEMPERATURA AMBIENTE NO MAYOR DE 30°C.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 55.976.

Fecha de la última revisión: enero de 2011.

Megalabs
Megalabs Argentina S.A.U.
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico

2005120175 A