TANVIMIL K
MENADIONA BISULFITO SÓDICO
Comprimidos

Industria Argentina - Venta bajo receta

COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene: Menadiona bisulfito sódico 10 mg.
Excipientes: Ludipress 76,40 mg; Almidón de maíz 23 mg; Kollidon CL 0,60 mg; Kollidon VA 64 2 mg; Ac-Di-Sol 3 mg; Estearato de magnesio 5 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Vitamina K, antihemorrágico (según clasificación ATC B02B A).

INDICACIONES:
Deficiencias de vitamina K por diferentes causas (insuficiencia de bilis, terapéutica prolongada con antibióticos, ileostomía, etc.).
Tratamiento en pacientes que no toleran bien la vitamina K natural, como aquellos que tienen una menor secreción de ácidos biliares.
Profilaxis y tratamiento de las amigdalectomías. Epistaxis, hematurias, melenas, hematemesis, hemoptisis, menstruación profusa, metropatías hemorrágicas, hemorragias postpartum y postabortum, púrpuras trombopénicas y vasculares, gingivorragias. Extracciones dentarias en diabéticos y hemópatas. Hemorragias quirúrgicas y traumáticas. En cirugías plásticas para reducir hematomas postquirúrgicos.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS:
Acción farmacológica: La vitamina K juega un papel importante en la coagulación de la sangre. La vitamina K promueve la biosíntesis hepática de protrombina activa (factor II), proconvertina (factor VII), factor de Christmas (factor IX) y factor de Stuart (factor X); los cuales son necesarios para la normal coagulación de la sangre. La vitamina K es un cofactor esencial para una enzima microsomal hepática que cataliza la carboxilación postraduccional de los precursores de los citados factores de la coagulación. Mejora el metabolismo óseo.
Farmacocinética: Por su carácter liposoluble se absorbe rápidamente en el intestino (duodeno) en presencia de bilis. Una vez absorbida, la vitamina K pasa al hígado y se aprovecha totalmente sin que se acumule. La vitamina K atraviesa con dificultad la barrera placentaria de madre a hijo y pasa en poca cantidad a la leche materna. Su biotransformación hepática es rápida, total y completa, por ello no se excreta por orina y aparece en buena proporción en las heces. Las hemorragias debidas a deficiencia de vitamina K se controlan después de 3 a 6 horas desde la administración oral.

POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO:
Vía oral.
Profilaxis:
Adultos: 1 comprimido por día.
Tratamiento:
Hipoprotrombinemia inducida por anticoagulantes: Adultos: 1 (10 mg) ó 2 (20 mg) comprimidos por día o según criterio médico. (Raramente más de 50 mg). Las dosis subsecuentes se determinarán con la respuesta del tiempo de protrombina y/o la condición clínica.
Hipoprotrombinemia debida a otras causas: Adultos: 1 ó 2 comprimidos (10 ó 20 mg) por día. La cantidad administrada depende de la severidad de la condición y de la respuesta clínica obtenida.

CONTRAINDICACIONES:
Absolutas: Función hepática disminuida. Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Sensibilidad a los derivados de la vitamina K.

ADVERTENCIAS:
La administración a pacientes tratados con anticoagulantes orales puede provocar fenómenos tromboembólicos. Los tratamientos prolongados no son seguros (toxicidad hepática) en el paciente con enfermedad hepática.

PRECAUCIONES:
Generales: Si la respuesta a la Menadiona no fue inmediata tras la primera dosis, debe descartarse la presencia de un problema congénito que origina la falta de respuesta a la vitamina K. El tiempo de protrombina debe ser chequeado regularmente como indicador de la condición clínica.
Uso en embarazo / lactancia: Se recomienda su indicación en la madre en el período previo al parto para prevenir hemorragias en el recién nacido. Es baja su distribución en leche materna, pero no se documentaron problemas relacionados a su uso.
Uso en pediatría: No está indicado su uso.
Uso en geriatría: No hay información disponible en relación con la edad y los efectos de la vitamina K.
Interacciones: Los antiácidos que contienen aluminio pueden precipitar los ácidos biliares del intestino delgado y de esta manera disminuir la absorción de la Menadiona. Antibióticos de amplio espectro, quinidina, quinina, salicilatos, sulfonamidas incrementan los requerimientos de vitamina K. Anticoagulantes derivados cumarínicos ven disminuida su actividad si se administran de forma concomitante con la vitamina K. Colestiramina, colestipol, aceite mineral, sucralfato disminuyen la absorción de la vitamina K. Dactinomicina disminuye los efectos de la vitamina K. Hemolíticos potencian los efectos tóxicos.

REACCIONES ADVERSAS:
Las siguientes reacciones adversas no se producen con la administración oral de vitamina K en las dosis indicadas.
A mayores dosis se han descripto: anemia hemolítica, hiperbilirrubinemia, kernícterus en el recién nacido, especialmente en el prematuro cuando se administró vitamina K en forma parenteral en dosis elevadas a la madre. Puede inducir hemólisis en pacientes con deficiencia eritrocitaria congénita de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

PRESENTACION:
Envases conteniendo: 10 comprimidos.

SOBREDOSIFICACIÓN:
"Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada."
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Tratamiento orientativo inicial de la sobredosificación: Luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos ingeridos y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, el profesional decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate: Vómito provocado o Lavado gástrico, Carbón activado, Purgante salino (45 a 60 min. luego del C.A.), Hemodiálisis. Antídotos específicos, si existen.

MANTENER EL MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 25.184

Fecha de última revisión: 19/05/05

Megalabs
Megalabs Argentina S.A.U.
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Gustavo H. Aguirre - Farmacéutico

2005120198 A